

CO5-16

<b>Título:</b>	<b>SEGUIMIENTO DE LAS LESIONES INTRAEPITELIALES ESCAMOSAS DE ALTO GRADO TRAS CONIZACIÓN</b>
<b>Autor-es:</b>	Lorena González Regal, Lucía Almeida Valverde, Mónica Fernández Manchado, Alfonso Quesada López-Fe, Santiago Iglesias Peláez, Felipe Martín Casañas.
<b>Centro de trabajo:</b>	Unidad de patología cervical y del tracto genital inferior. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
<b>Ciudad:</b>	Tenerife
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:ialmval@gobiernodecanarias.org">ialmval@gobiernodecanarias.org</a>
<b>Objetivo:</b>	Establecer el porcentaje de persistencias-recidivas de las HSIL conización tanto con asa de diatermia como con bisturí. Relacionarlo con el estado de los márgenes quirúrgicos de la pieza y valorar el legrado endocervical pos-conización.
<b>Material y Método:</b>	Estudio retrospectivo de 121 casos de conización por HSIL en un período de dos años. Análisis estadístico de los datos mediante SPSS 13.0
<b>Resultados:</b>	El número de persistencias-recidivas depende en gran medida del estado de los márgenes pos-conización, en especial cuando es el margen endocervical profundo el afectado.
<b>Conclusiones:</b>	El seguimiento de las pacientes conizadas por HSIL se hace imprescindible, en especial en aquellos casos con margen endocervical profundo afecto.