

CO5-5

Título:	CONIZACIONES CON ASA DE DIATERMIA. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Autor-es:	ML Franco Márquez, LC García Lancha, H Millán Cantero, C Escudero Severín.
Centro de trabajo:	Hospital San Juan de Dios del Aljarafe
Ciudad:	Sevilla
E-mail:	mlfranco@aljarafe.sjd.es
Objetivo:	Analizar las conizaciones con asa de diatermia realizadas como tratamiento de la patología preinvasora cervical. Valorar el porcentaje de bordes afectos o dudosos y su correlación con la persistencia/recidiva.
Material y Método:	Se han llevado a cabo 69 conizaciones en el período comprendido entre enero 2004 y junio 2006 (27% de las citologías patológicas). La edad media es de 36,5 años. La técnica quirúrgica se realiza bajo anestesia local en la Unidad de Cirugía Ambulatoria. La unidad electro-quirúrgica se programa a 80 w de corte y 50 w de coagulación. El corte se hace guiado por el test de Schiller. Se comprueba la extirpación de zona afecta con nueva tinción de lugol.
Resultados:	De las 69 conizaciones realizadas, 58 (84%) se indicaron por H-SIL en biopsia, 10 (14,5%) por persistencia de L-SIL y una (1,5%) por carcinoma epidermoide microinvasor. Cinco (7,2%) presentaban bordes quirúrgicos afectos y 18 (26,1%) no valorables.
Conclusiones:	La incidencia de bordes afectos (7,2%) concuerda con los datos publicados (4,5-39%). Consideramos elevada la incidencia de bordes dudosos (26%) que posiblemente pueda verse reducida al disminuir la intensidad del corte.