

CO6-1

Título:	PATOLOGÍA ASOCIADA DEL TRACTO GENITAL INFERIOR EN PACIENTES CON CONDILOMAS ACUMINADOS DE VULVA.
Autor-es:	F Aznar, I Montilla, JA Monserrat, M Santaella, JA Borrego.
Centro de trabajo:	Sección de Prevención del Cáncer.Hospital Universitario Reina Sofía.
Ciudad:	Córdoba
E-mail:	citolab21@hotmail.com
Objetivo:	Resaltar la importancia que tiene un estudio completo del tracto genital inferior, en pacientes que presentan condilomas acuminados de vulva.
Material y Método:	Estudio retrospectivo de 174 pacientes que fueron diagnosticadas de condilomas vulvares. A todas las pacientes enviadas por esta patología se les sometió a un estudio que comprende realización de citología de triple toma, colposcopia, biopsia dirigida si se observan imágenes atípicas y exploración pèlvica.
Resultados:	El motivo de envío a nuestra consulta en la mayoría de las pacientes fue la presencia de condilomas, 135 (77,5%), seguido de anomalías en la citología, 27 (15,5%). Se encontraron durante la exploración la presencia de condilomas vaginales en 62 pacientes (35,6%). En el estudio colposcópico se observaron imágenes normales en 48 (27,5%), en 23 (13,2%) presentaban imágenes de condilomas en cervix y en 78 casos (44,8%) presentaban imágenes atípicas. El resultado del estudio citológico fue normal en 69 pacientes (39,6%), inflamatoria en 23 (13,2%), LSIL en 58 (33,3%) y HSIL en 27 (15,5%). De las 101 pacientes a las que se realizó biopsia dirigida se encontró CIN1 en 46 (26,4%) y CIN2-3 en 26 (14,9%).
Conclusiones:	Las pacientes con condilomas vulvares presentan un alto índice de neoplasia cervical intraepitelial, en comparación con la población general. Es fundamental concienciar a todos los especialistas y médicos generales que tratan esta patología, de la importancia que tiene un examen exhaustivo de todo el tracto genital inferior, para detectar estas lesiones y tratarlas evitando su progresión.