

CO6-3

Título:	DONOVANOSIS GENITAL, (caso clínico)
Autor-es:	L. Ribot, E. Garcia, S. Medina, L. Serra, C. Muñoz (1), Y. Canet
Centro de trabajo:	Servicio de Ginecología y (1) Servicio de Dermatología. Consorti Sanitari Parc Taulí
Ciudad:	Sabadell
E-mail:	lribot@cspt.es
Objetivo:	Presentación de un caso de Donovanosis genital
Material y Método:	Mujer de 19 años, gestante no controlada de unas 32 semanas de amenorrea (SA), sin antecedentes patológicos de interés, inmigrante de Bolivia. Acude a urgencias de ginecología por sangrado y dolor perineal de 1 mes de evolución. Al explorarla, se objetivan 4 lesiones perineales exofíticas, rosadas, sangrantes y dolorosas al tacto.
Resultados:	Se cursan biopsias, serologías y cultivos de las lesiones, obteniendo como resultado de las biopsias infiltrado inflamatorio mixto con ulceración de epidermis y tejido de granulación subyacente, serología positiva para el VIH y cultivos negativos. La paciente consulta repetidamente por dolor y sangrado, realizándose cesárea electiva a las 37 SA por VIH, sin tratamiento adecuado, e imposibilidad de control del dolor. Conjuntamente con el servicio de dermatología, llegamos al diagnóstico de sospecha de Donovanosis genital, realizando recogida de muestra para fresco y tinción Giemsa. Se instaura tratamiento empírico con Azitromicina 1g semanal, con el que se consiguió la curación de las lesiones. Orientados nuestros patólogos, confirmamos el diagnóstico en unos días.
Conclusiones:	La Donovanosis es una enfermedad de transmisión sexual, causada por <i>Calymmabacterium granulomatosis</i> , que produce lesiones ulcerativas granulomatosas localizadas en región genito-perianal, de curso crónico, y que es endémica en Nueva Guinea, América latina, África del sur, India y el Caribe. Debido al incremento de población inmigrante, se observa un aumento de enfermedades de transmisión sexual poco prevalentes en nuestro país, lo cual debe considerarse al establecer el diagnóstico diferencial de la patología infecciosa genital.