

CO6-5

Título:	Úlcera vulvar aguda de Lipschütz, (dos casos clínicos)
Autor-es:	Marta Salvador Osuna, Rocío Montejo Rodríguez, Gema Vaquero Arguello, Santiago Alonso.
Centro de trabajo:	
Ciudad:	
E-mail:	
Objetivo:	Presentación de una entidad poco conocida; la úlcera vulvar aguda de Lipschütz a través de iconografía fotográfica con el correspondiente diagnóstico diferencial con otras entidades.
Material y Método:	Se presentan dos casos y su correspondiente iconografía clínica, el diagnóstico diferencial y el tratamiento de la úlcera vulvar aguda. El diagnóstico diferencial se debe establecer con; <ol style="list-style-type: none"> 1. Eritema fijo por medicamentos 2. Síndrome de Behcet. 3. Eritema multiforme (eritema polimorfo). 4. Psoriasis. 5. Liquen plano. 6. Liquen escleroso 7. Pénfigo vulgar 8. Lesiones auto-infligidas o por abuso sexual.
Resultados:	En ambos casos se estableció un tratamiento con corticoide oral y anti-inflamatorios con buen resultado, obteniendo la remisión total en dos semanas.
Conclusiones:	La úlcera genital aguda es una entidad poco frecuente, sin embargo es importante tenerla en cuenta ya que estas pacientes a menudo son mal diagnosticadas, recibiendo tratamientos innecesarios.