

Noelia González Ibáñez ⁽¹⁾, María Esteban García ⁽¹⁾, Adriana Zallo Díaz ⁽¹⁾, Ana Vázquez del Campo ⁽¹⁾, Diego Erasun Mora ⁽²⁾, Elena Prieto Ruiz ⁽¹⁾

- ⁽¹⁾ Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander (Cantabria)

- ⁽²⁾ Hospital de Laredo. Laredo (Cantabria).

OBJETIVOS

Describir la frecuencia de complicaciones que aparecen en forma de **aborto tardío** o **parto pretérmino** en las mujeres que consiguen gestación tras una **conización cervical** en nuestro centro, ya que se incrementan estos riesgos **en relación con el volumen de tejido cervical excisionado** en los tratamientos Lletz.

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo

704 técnicas excisionales ambulatorias


Periodo entre enero 2016 y junio 2021.

Edad media 41.59 años (+/- 11.21)

Media de gestaciones 1.51 (+/-1.47).

Hemos analizado la evolución de las gestaciones de mujeres conizadas.

RESULTADOS



CONCLUSIONES

Las técnicas excisionales aplicadas a **mujeres fértiles** pueden tener un **impacto en la evolución de futuras gestaciones**, incrementando el **riesgo de parto pretérmino**, por lo que parece prudente la **vigilancia periódica de la longitud cervical durante la gestación** en estas mujeres, así como ser lo más conservador posible a la hora de realizar estos tratamientos.