

OBJETIVOS

Comparar las indicaciones y resultados de las conizaciones realizadas a nivel ambulatorio con anestesia local con las conizaciones realizadas en quirófano.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio observacional descriptivo retrospectivo de las conizaciones cervicales realizadas en nuestra Unidad de Patología Cervical y Colposcopia del Hospital Sant Joan de Déu de Manresa desde enero del 2018 a diciembre del 2020.

Se incluyen un total de 105 conizaciones que se dividen en 2 grupos. Se comparan analizando las indicaciones y la afectación de los márgenes.

CONCLUSIONES

La mayoría de conizaciones se realizan a nivel ambulatorio optimizando los recursos y cumpliendo con los estándares de calidad establecidos por la AEPCC.

La principal indicación de la conización quirúrgica es el deseo de la paciente, seguido de aquellas reconizaciones con cérvix residual escaso en el que se sospecha un procedimiento complejo para ser realizado con anestesia local.

La afectación de márgenes no se ve modificada por el tipo de anestesia empleada.

RESULTADOS	Ambulatorias	Quirúrgicas
Total	72.1%	27.9%
Confirmación de lesión histológica	94.7%	92.8%
Indicación de conización		
Discordancia cito-histológica	6.3%	10%
CIN I	22.1%	23.3%
CIN II-III	69.4%	63.3%
Sospecha carcinoma	2.11%	3.3%
Afectación márgenes quirúrgicos	22.2%	36.6%
Exocérvix	4.2%	10%
Endocérvix	14.9%	20%
Exocérvix + endocérvix	3.1%	6.6%