

¿EXISTEN DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS EN LOS LLETZ RELACIONADAS CON LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL?

Vázquez del Campo, Ana; Erasun Mora, Diego; Zallo Saíenz, Adriana; Esteban García, María; Gonzalez Ibañez, Noelia, Prieto Ruíz, Elena

Objetivo, material y métodos

- ¿experiencia del facultativo condiciona mejores resultados?
- ¿los resultados se ajustan a los estándares de calidad?
- Estudio retrospectivo longitudinal
- 704 técnicas escisionales ambulatorias
- Periodo de enero de 2016 y junio 2021
- Realizadas por 5 facultativos distintos.
- Revisión de las historias clínicas analizando múltiples variables para proceder a un análisis descriptivo y comparativo posterior con el paquete de datos SPSS

CONCLUSIONES

1. El manejo de las pacientes por parte de la nueva incorporación a la unidad de colposcopia **se ajustan a los estándares de calidad propuestos**
2. Tendencia anual orienta a **una mayor preservación** de tejido cervical con una **mayor tasa de márgenes libres**.
3. La incidencia de **complicaciones, recidivas, aclaramiento viral y márgenes afectados es similar** a la obtenida por el resto de facultativos con más experiencia
4. **Mayor cobertura vacunal**
5. En la población estudiada la experiencia profesional no parece influir significativamente en los resultados

- ❑ 71 técnicas escisionales en 2 años,
- ❑ Complicaciones en un 7%.
- ❑ 87% se excisionó un volumen mayor a 2cm³
- ❑ Aclaramiento viral post-tratamiento del 56%, una persistencia del 16%.
- ❑ 85% de márgenes libres en total.
- ❑ 100% con biopsia previa, de las cuales 92% CIN II-III confirmandose en más del 85% de los casos estos resultados
- ❑ En el 100% de las colposcopias se describía la zona de transformación
- ❑ El facultativo ha realizado anualmente más de 50 colposcopias de bajo y alto riesgo.

Resultados del facultativo analizado (menos experiencia)

- ✓ Márgenes afectos 22.5% (2020) y 7.8%(2021)
- ✓ Tendencia a la obtención de muestra cada vez más conservadora (96% volumen > 2cm³ vs 78%), 2020 y 2021 respectivamente

***Diferencias estadísticamente no significativas**

Al comparar el primer y segundo año de experiencia (2020 y 2021)

- ❖ **Diferencias estadísticamente significativas** en cuanto a los **márgenes afectados** (14% facultativo recién incorporado vs 18-29% de facultativos con mayor experiencia).
- ❖ **No se han encontrado diferencias significativas en cuanto a las complicaciones** siendo similares en todos los facultativos.
- ❖ El 53% de las pacientes sometidas a tratamiento por el facultativo recién incorporado están actualmente vacunadas, habiéndose propuesto a un 29%, una cobertura mucho más alta respecto a la población total estudiada.

Al comparar entre facultativos