

Análisis de resultados de las conizaciones cervicales realizadas en consulta versus las realizadas en quirófano

Fueyo Pestaña S., Gonzalez Corbella O., Fernández Quintana B., Murillo Carrasco A., Del Valle Peña D., Lekuona Artola A.
Hospital Universitario Donostia

INTRODUCCIÓN

La conización es el tratamiento estándar de las lesiones de alto grado. Aunque es muy eficaz, entre un 5-25% de las pacientes sufre recurrencia o persistencia de las lesiones. Los resultados obtenidos dependen de la experiencia del cirujano y de la utilización de un equipo adecuado.

Desde hace años en nuestra Unidad de Colposcopia se está instaurando la realización de la conización cervical en la consulta. Esto supone un beneficio para la comodidad de la paciente y en nuestro caso la posibilidad de realizarla bajo visión colposcópica, lo cuál no podemos realizar en quirófano.

OBJETIVOS

Analizar los resultados de las conizaciones cervicales en consulta para comprobar que no son inferiores a los de las realizadas en CMA.

MATERIAL Y MÉTODOS

- 162 pacientes conizadas durante 2018 en el Hospital Universitario Donostia
- Comparación de los bordes de la pieza quirúrgica y la persistencia del VPH a los 6 meses según si se ha realizado la conización en consulta o CMA.

RESULTADOS

Fig. 1. Distribución de conizaciones y características




Tabla 1. Comparación de resultados

	Consulta	CMA	p
VPH precono	100 %	94,9 %	p=0,18
VPH postcono	36,7 %	22,5 %	p=0,78
Bordes libres	64,7 %	64,8 %	p=0,56

CONCLUSIONES

La realización de las conizaciones cervicales en consulta no empeora los resultados analizados.

Con el tamaño muestral que disponemos no podemos obtener más conclusiones, pero esperable que gracias a la visión colposcópica directa en consulta, se puede ajustar más el tratamiento.