

# REVISION DE LAS CONIZACIONES INDICADAS POR L-SIL PERSISTENTE



Jiménez Gallego AB; Ramírez Osuna A; Gregori Arriaza A; González Granados C

### OBJETIVO

Determinación de factores de riesgo para L-SIL persistente y análisis de la correlación cito-colposcópica respecto al resultado anatómo-patológico postconización.


### MATERIAL Y MÉTODO

Análisis observacional retrospectivo de las conizaciones indicadas por L-SIL persistente:

- Conizaciones realizadas entre junio 2019 – junio 2021
- L-SIL persistente = citología L-SIL durante 2 años
- n = 15 casos

### RESULTADOS

- 16% del total de conizaciones
- Franja de edad 28-53 años, 40 años de media



CLASIFICACIÓN COLPOSCÓPICA		
SIN ALTERACIONES	GRADO 1	GRADO 2
1'5%	73%	13%

BIOPSIA COLPODIRIGIDA		
SIN ALTERACIONES	CIN 1	CIN 2-3
20%	80%	0%

RESULTADO ANATOMO-PATOLÓGICO POSTCONO		
SIN ALTERACIONES	CIN 1	CIN 2
20%	60%	13%

### Análisis CIN 2

- 50% borde endocervical afecto
- 50% procedentes de colposcopia grado 2 con biopsia colpodirigida CIN 1
- 50% procedentes de colposcopia grado 1

### CONCLUSIONES

- Factores de riesgo:
  - Premenopausia
  - Fumadora
  - No parece haber influencia de la paridad
- Buena correlación cito-colpo-anatomopatológica.
- Conveniencia de mayor rigurosidad en la indicación de conización por LSIL persistente:
  - Alto porcentaje de conizaciones sin alteraciones (1/5).
  - Mayoría de LSIL persistentes regresan espontáneamente en el seguimiento