

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LOS CASOS DE NEOPLASIA VAGINAL INTRAEPITELIAL (VaIN) EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

- 1.9 casos/año
- Edad media: 57.5 años.
- Localización:



1/3 Superior
76.2%

1/3 Medio
4.8%

1/3 Inferior
9.5%

- Sintomáticas: 61.9%. Prurito y sangrado lo más común.
- Asociación o antecedentes de:
 - 55.6% de CIN y 38.9% de Carcinoma de Cérvix
 - 11.1% de HSIL/VIN y 5.6% de Carcinoma Vulvar
 - 14.29% Carcinoma de laringe

- VPH en 86.7%.



16 (más prevalente)
18, 52 y 56
39, 51, 35, 11 y 53

- Otros factores de riesgo:
 - Tabaco, VHC, VHB, VIH y leucemia: heterogéneo
 - Histerectomía previa 68% y Conización previa 9.5%
- Tratamiento:
 - Escisional 42.9%
 - Destructivo con laser CO2 o argón 23.8%
 - Médico con Imiquimod o 5-Fluorouracilo 14.3%
 - Terapias combinadas 19%
- Recidiva 23.8% (Tiempo medio 32 meses). HSIL/VaIN persistente 23.8%. Progresión a Carcinoma Vaginal 23.8%