

¿EN QUÉ ASPECTOS EMPEORA EL TABAQUISMO NUESTROS RESULTADOS EN PATOLOGIA CERVICAL?

Diego Erasun Mora⁽¹⁾, Ana Vázquez del Campo⁽²⁾, Elena Prieto Ruiz⁽²⁾, Adriana Zallo Díaz⁽²⁾, Noelia González Ibáñez⁽²⁾, María Esteban García⁽²⁾.
⁽¹⁾Hospital Comarcal de Laredo. Laredo. Cantabria. España. Correspondencia: Diego.Erasun@alumni.unav.es.

⁽²⁾Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. Cantabria. España.



Introducción:

El tabaco es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de cérvix por diferentes vías etiológicas.

Material y métodos:

Estudio retrospectivo longitudinal de 705 técnicas escisionales ambulatorias entre enero 2016 y junio 2021 mediante paquete estadístico SPSS v. 25 analizando variables edad, genotipo VPH, paridad, criterio y origen de derivación, hallazgos colposcópicos, biopsia previa a la técnica, resultados histológicos de la pieza de conización, márgenes, complicaciones hemorrágicas y aclaramiento viral a los 2 años en mujeres fumadoras frente a las no fumadoras en nuestra serie.

Resultados

Variable	No fumadoras	Fumadoras	Comparativa/Valor“P”
Edad(años)	42,71	39,78	T=-5,110, P<0,01
HSIL citológico	46,6%	49,4%	$\chi^2 = 0,5P, P>0,05$
VPH 16/18	55,5%	59,2%	$\chi^2 = 2,23. P>0,1$
Cambios g.ºII	51,4%	64,7%	$\chi^2 = 15,79, P>0,01$
HSIL/CIN II+ en ap.	66,8%	76%	$\chi^2 = 48,96, P<0,01$
Márgenes (+)	17,9%	23,0%	$\chi^2 = 2,88. P>0,05$ y $<0,1$
Complicaciones Hemorrágicas	9,4%	5%	$\chi^2 = 4,31, P<0,05$
Recaída 6 meses	3,9%	4,3%	$\chi^2 = 0,04, P>0,1$
Recaída a 1 año	3,7%	6,8%	$\chi^2 = 2,38, P>0,1$
Persistencia viral a 2 a	17,7%	6,7%	$\chi^2 = 2.9\%. P>0,05$ y $<0,1$

Conclusiones:

El tabaco es un factor pronóstico vital independiente.

Según nuestros datos, las mujeres fumadoras son más jóvenes y con peores resultados histológicos, además de mayor persistencia viral post técnica a largo plazo.

La recomendación del cese del tabaco debe estar incluida en todas nuestras consultas.

