

Relevancia de la vacunación en la progresión de la enfermedad en pacientes conizadas por lesiones alto grado



Consuegra Garrido IM¹, Moreno Pérez A¹, Navalón Bonal Z¹, Portillo Muñoz S¹, De la Rosa Muñoz M¹, Martí Edo M¹

¹Hospital General Universitario de Ciudad Real

OBJETIVOS

* Analizar si en las pacientes con tratamiento escisional por lesiones de alto grado, es relevante en su progresión o persistencia de la enfermedad, la vacunación de VPH.

MATERIAL Y MÉTODOS

* Estudio observacional cohorte retrospectivo. Se analizan 17 pacientes del HGUCR: 11 (73.3%) vacunación completa tras tratamiento escisional, frente a 4 (26.7%) sin vacunar.

RESULTADOS

Entre las pacientes con tratamiento escisional que no se vacunaron (26.7%) y las que recibieron la dosis completa (73.3%) no hubo diferencias significativas en cuanto a la progresión de la enfermedad tras la cirugía ($p=0.516$)


En cuanto a la persistencia de la enfermedad, tampoco mostró diferencias significativas la vacunación ($p=0.516$)

CONCLUSIONES

* Se demuestra que no se existe influencia, en pacientes conizadas por lesiones de alto grado, por parte de la vacunación de VPH, en su progresión o persistencia de enfermedad.

* Es relevante continuar con la selección de pacientes para el estudio.

PACIENTES TRAS TRATAMIENTO ESCISIONAL



■ No vacunadas ■ Vacunación completa

RELEVANCIA VACUNACIÓN EN PROGRESIÓN ENFERMEDAD

