

Objetivo

Valorar el conocimiento de la población sobre ITS y determinar si existen diferencias entre poblaciones consideradas de alto y bajo riesgo a priori.

Material y métodos

Se realizó un estudio transversal en la población del área de salud del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Se reclutó pacientes asintomáticas con edades comprendidas entre el inicio de las relaciones sexuales y los 65 años que acuden a las consultas de los Centros de Especialidades Periféricas (CEP) y a la consulta de Patología Cervical por otro motivo.

Las pacientes de Patología Cervical serán consideradas como alto riesgo por ser portadoras ya de una ITS (VPH), frente a las del CEP que serán consideradas de bajo riesgo.

Se realizó una entrevista telefónica para valorar su conocimiento sobre ITS.

Resultados

Resultado de las preguntas de la entrevista	Frecuencia		P valor
	Sí	No	
Nombran ITS	123 (79,87%)	31 (20,13%)	p=1
Conocen métodos barrera	67 (43,51%)	87 (56,49%)	p=0,33
Conocen las vías de transmisión de las ITS	104(67,53 %)	50 (32,47%)	p=0,78
Conocen que la mayoría de las ITS son asintomáticas	71(46,10%)	83(53,90%)	p=0,90
Conocen posibles complicaciones	66 (42,86%)	88 (57,14%)	p=0,05

Resultado de las preguntas de la entrevista	Frecuencia absoluta		
	Sí	No	
Nombran ITS	Positivas	9	2
	Negativas	111	29
Conocen métodos barrera	Positivas	4	7
	Negativas	63	77
Conocen las vías de transmisión de las ITS	Positivas	9	2
	Negativas	93	47
Conocen que la mayoría de las ITS son asintomáticas	Positivas	6	5
	Negativas	64	76
Conocen posibles complicaciones	Positivas	8	3
	Negativas	56	84

Conclusiones

El 79% de las entrevistadas supieron mencionar una ITS. Puede ser cuestionable que este hecho se considere un verdadero conocimiento.

La mayoría de las pacientes que utilizan métodos de barrera los emplean con fines únicamente anticonceptivos, creyendo que otros métodos anticonceptivos protegen también de ITS.

La mayoría de las mujeres desconocen que las ITS suelen ser asintomáticas.

Complicaciones de las ITS, como el dolor pélvico crónico, no fueron reseñadas por ninguna de las entrevistadas.

Este estudio, pone en evidencia la falta de educación sexual que han recibido las mujeres del estudio, lo cual pone de manifiesto la necesidad de mayores campañas de educación sexual, no solo en centros educativos sino en otros ámbitos que lleguen más a la población general.