

CORRELACIÓN ENTRE HALLAZGOS EN LA COLPOSCOPIA Y RESULTADO DE LA BIOPSIA.



Esther Ruiz Pérez, Álvaro Sanz Diaz-Heredero, Lidia Casamayor Del Nogal, María Cuaresma González, Victoria Pascual Escudero, Susana Cortés Pérez. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

OBJETIVOS

- Analizar **correlación** entre **hallazgos colposcópicos** y resultado de la **biopsia** colpoguiada.
- Describir las **características demográficas** de las pacientes en las que se realiza colposcopia y biopsia cervical.
- Estudiar la **validez interna y externa** de la **colposcopia** como prueba diagnóstica en las lesiones cervicales.


MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio	Observacional, descriptivo y retrospectivo.
Muestra	N=46. Pacientes con biopsia cervical .
Periodo	Enero-Diciembre 2020.
Variables	Edad, tabaco, edad de inicio de relaciones sexuales, número de parejas, método anticonceptivo (MAC), inmunosupresión, citología, genotipo VPH, hallazgos colposcópicos, citología endocervical(si procede) y resultado de biopsia cervical.
Fuente	Base de datos de patología cervical de nuestro centro.


RESULTADOS

Edad	Mediana: 44,5.
Fumadoras	27 (48,7%).
Inicio relaciones sexuales	18 años.
Nº parejas sex.	4.
MAC barrera	20 (43,5%).

CITOLOGÍA



COLPOSCOPIA



	LSIL	HSIL
Cambios g.1	96,4%	3,6%
Cambios g.2	38,9	61,1%

Correlación hallazgos colposcopia y biopsia: **82,6%**.
Sensibilidad: 91,7%. Especificidad: 79%.
VPP: 61,1%. VPN: 96,4%.

CONCLUSIONES

Nuestra capacidad diagnóstica para lesiones intraepiteliales, se encuentra en un rango aceptable, con una **correlación del 82,6%**, postulándose la **colposcopia** como **prueba de elección** para el diagnóstico de estas alteraciones.