

Caso clínico: Linfangiectasia vulvar

Actualización de métodos de tratamiento

Alberch Grau A, Vila Camps E, Azkargorta Amenabar A, Merino Mesa E, Tió Muntadas G, Álvarez Castaño E
Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta

Objetivos

La **linfangiectasia vulvar** es una afección cutánea poco frecuente de los canales linfáticos superficiales que puede ser causada por radiación, traumatismo, enfermedad neoplásica, afecciones inflamatorias tales como enfermedad de Crohn o infecciones como la tuberculosis. También se ha asociado con la cirugía pélvica y la mutilación genital femenina. Se presenta con vesículas múltiples, coalescentes, trasudativas, a menudo acompañadas de hiperqueratosis, lo que da lugar a una apariencia verrugosa y se puede confundir con los condilomas. El diagnóstico es principalmente clínico con ayuda histopatológica.

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión del manejo actual de esta entidad y remarcar la importancia del diagnóstico anatomopatológico, a propósito de un caso que se atendió en el Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta.

Material y métodos

Caso clínico: Mujer de 38 años derivada a Ginecología desde su médico de atención primaria por presencia de **prurito vulvar** y estudio de **posibles condilomas** tratados con Imiquimod sin mejoría. La paciente también refería aparición de edema con **pápulas** a nivel de extremidad inferior derecha. A la exploración física se objetivan genitales externos con pápulas confluentes en los dos labios mayores con disposición longitudinal de 50 x 20 mm, sin signos de infección. No se observan lesiones a nivel de labios menores e introito. Ausencia de adenopatías inguinales.

Resultados

Se realiza **biopsia vulvar** objetivando **linfangiectasia vulvar e hiperplasia epidérmica** por lo que se programa una **vulvectomía superficial**. En las visitas de seguimiento, la paciente se encuentra asintomática, la cicatriz presenta un buen aspecto y se objetiva una vulva con anatomía prácticamente normal.

Conclusiones

Existen varias modalidades de tratamiento disponibles para esta afección. El tratamiento quirúrgico con **vulvectomía superficial es el método más utilizado** para tratar la linfangiectasia vulvar. El **láser de dióxido de carbono**, además de la **inyección de agentes esclerosantes**, la **crioterapia** y la **electrocoagulación** son otras modalidades de tratamiento. Recientemente se ha descrito la técnica de **anastomosis linfovenosa (LVA) y resección secundaria** que ha ofrecido resultados prometedores.

