

ACLARAMIENTO DEL VPH TRAS TRATAMIENTO ESCISIONAL: ¿QUÉ FACTORES INFLUYEN?



Esteban García M, Zallo Díaz A, González Ibáñez N, Vázquez del Campo A, Erasun Mora D, Prieto Ruiz E
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

OBJETIVOS

- Evaluar el porcentaje de **aclaramiento de la infección** por VPH en las mujeres sometidas a una conización cervical, así como los **genotipos más prevalentes** en nuestro medio.
- Conocer los factores que influyen en el aclaramiento viral tras la realización de un tratamiento escisional.


MÉTODOS

Estudio retrospectivo longitudinal con un tamaño muestral de **703 técnicas escisionales ambulatorias bajo visión directa** realizadas en nuestro centro entre **enero de 2016 y junio 2021**.


En el periodo estudiado, los **resultados a los 6 meses** fueron:



Tasas de aclaramiento viral en función de la edad y serotipo



El 40% de las mujeres de nuestra muestra son fumadoras. **El aclaramiento viral es mayor en mujeres no fumadoras (64,5%)** frente a no fumadoras (54,7%).



CONCLUSIONES

- El **49%** de nuestras pacientes **logran aclaramiento viral tras la técnica escisional**, persistiendo infección por el mismo serotipo en tan solo el 17%.
- En cuanto a los factores analizados que influyen en el aclaramiento viral tras la conización, encontramos diferencias estadísticamente significativas en **edad, serotipo y hábito tabáquico**.
- Debemos fomentar la **deshabituación tabáquica** en nuestras pacientes como factor favorecedor para el aclaramiento viral.