

PROGRESIÓN MALIGNA VULVAR Y VAGINAL EN PACIENTES CON LIQUEN ESCLEROSO: IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN EXHAUSTIVA

PRIMER CASO

Mujer 75 años, prurito vulvar de larga evolución, con diagnóstico de liquen. Progresión a VIN diferenciado multifocal tras 5 meses con lesiones a nivel paraclitoriano-labios menores y ambos perinés.



SEGUNDO CASO

Mujer de 80 años con liquen escleroso refractario a tratamiento tópicos. Tras 2 años, aparición de lesión blanquecina en cistocele, con resultado tras biopsia de carcinoma infiltrante de vagina.



Diez-Madroño Cendrero L^a, Loira Calvar T^b, Gutiérrez Montalbán I^b, Peláez Orero M^b, Ruíz López C^b, Domínguez García, C^a.
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. ^aFacultativo Especialista en Obstetricia y Ginecología, ^b Médico Interno Residente

OBJETIVO

Recaltar la importancia del seguimiento y correcta exploración vulvar en pacientes con liquen escleroso, debido al riesgo de progresión de esta lesión sin claros signos predictores.

CONCLUSIONES

La exploración minuciosa y las biopsias dirigidas son muy importantes en pacientes con liquen escleroso. Dificultosa por la progresión de la enfermedad e infraestimación de la misma