

Cirugía ambulatoria de las lesiones premalignas de cérvix: ¿Es una opción a tener en cuenta?

Merino E.S, Ordás P, Cristóbal I, González C, Serrano M, Hernández A.

Antecedentes y objetivos

En nuestro centro, desde el año 2019, una gran proporción de los tratamientos de las lesiones premalignas de cérvix, son realizados de manera ambulatoria.

Material y métodos

Estudio de **cohortes prospectivo** que analiza las características de las conizaciones y vaporizaciones cervicales, realizadas entre septiembre de 2020 y mayo de 2021.

Resultados

Recogemos 113 pacientes. Al 28,3% se les realizó el procedimiento en quirófano y al 71,7% ambulatorio. La **edad** de las pacientes con tratamiento **ambulatorio** fue **menor**. ($p < 0,001$)

Se hallaron **diferencias significativas** respecto a:

- El **tiempo de espera**, **menor** ($p < 0,001$) en el tratamiento **ambulatorio**.
- La **duración** del procedimiento, **menor** en el grupo **ambulatorio**, ($p < 0,001$)
- La **satisfacción**, **mayor** con tratamiento **ambulatorio** ($p < 0,01$)
- El **grosor** del cono, **menor** en las conizaciones **ambulatorias** ($p < 0,003$)

No se hallaron **diferencias** significativas respecto a:

- El **dolor**, las **complicaciones** ni el **sangrado** durante el procedimiento.
- El **dolor**, **sangrado** y consultas en **urgencias** tras el tratamiento.
- La tasa de **bordes quirúrgicos afectados** en las conizaciones.

Conclusión

La realización de **tratamientos quirúrgicos de forma ambulatoria** en pacientes con lesiones premalignas de cérvix es una opción **segura**, **sin aumento de la morbilidad** postquirúrgica, con **menor tiempo de espera**, **menor duración** y que ha sido **bien aceptada** por las pacientes.

