

ACLARAMIENTO VIRAL POST-CONIZACIÓN

Rebeca Benito Villena, M.Ángeles Calderón Rodríguez, Laura Revelles Paniza, Andrea Gallardo Vera
Hospital materno-infantil Virgen de las Nieves de Granada

INTRODUCCIÓN

La escisión completa de las lesiones premalignas de cérvix elimina tanto la lesión como el VPH. Según la AEPCCC, el 70% de las pacientes aclaran el virus a los 6-12 meses tras la escisión.

Objetivo: analizar nuestra tasa de aclaramiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisión de historias clínicas a partir de los registros de conizaciones.

Periodo: **01/01/2017 – 31/12/2019**

Técnica: **conización con asa de diatermia**

CONCLUSIÓN

La **tasa de aclaramiento viral post-conización** en nuestro centro es **similar** a la publicada en las guías de la **AEPCCC**.

RESULTADOS

N = 301	}	22 sin lesión	
		2 cánceres	
		51 CIN 1	→ 96% bordes libres
		228 CIN 2-3	→ 77,2% bordes libres

CIN 1

Aclaramiento viral a los 6 meses: 62,7%

El **79%** de las pacientes que fueron **VPH(+)** a los **6 meses** **siguieron** siéndolo a los **12 meses**.

CIN 2-3

Aclaramiento viral a los 6 meses: 62%

El **63,5%** de las pacientes que fueron **VPH(+)** a los **6 meses** **siguieron** siéndolo a los **12 meses**.