

Hinojosa Sanchez, Lourdes; Calveras Auge, Joana; Ruiz Lara, Luís; Bergós Sorolla, Carmen.
Unidad de Patología Cervical y Colposcopia. Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Fundació Althaia.

OBJETIVOS

Realizar una auditoría interna de nuestra Unidad de Patología Cervical y Colposcopia y revisar si cumplimos con los indicadores de calidad colposcópica propuestos por la guía de la AEPCC del 2018.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio observacional descriptivo retrospectivo donde se analizan las colposcopias, las biopsias y las conizaciones realizadas en nuestra Unidad de Patología Cervical y Colposcopia desde el año 2018 al 2020.

Se incluyen un total de 105 conizaciones y se comparan los resultados con los indicadores de calidad de la European Federation for Colposcopy del 2017 (Guía AEPCC del 2018).

CONCLUSIONES

Nuestra Unidad de Patología Cervical y Colposcopia cumple con la mayoría de los indicadores de calidad establecidos por la AEPCC y las sociedades europeas.

Como punto de mejora importante, destacamos la necesidad de adquirir un colposcopio que nos permita realizar las conizaciones bajo control colposcópico (actualmente hacemos una revisión de las imágenes guardadas en la historia clínica previa al procedimiento). El hecho de no llegar al 70% de conizaciones con lesión \geq HSIL/CIN2, ha

sido debido a que más de un 30% de las conizaciones han sido indicadas por LSIL/CIN1 persistente de más de 2 años de evolución.

Es necesario realizar revisiones periódicas de los indicadores de calidad para mejorar el tratamiento y seguimiento de nuestras pacientes.

RESULTADOS

Indicador de calidad	Recomendación AEPCC	Nuestro centro
Acreditación colposcópica de los miembros de la unidad	> 50%	66%
Documentación y registro de los hallazgos colposcópicos	> 90%	100%
Porcentaje de conizaciones ambulatorias	> 70%	72.1%
Porcentaje de conizaciones realizadas bajo control colposcópico	> 90%	1%
Porcentaje de conizaciones con diagnóstico histológico de lesión \geq HSIL/CIN2	> 70%	62.5%
Porcentaje de conizaciones sin lesión hisitológica	< 15%	6.7%
Porcentaje de conizaciones con márgenes positivos	< 20%	28.5%
Porcentaje de conizaciones con margen endocervical positivo	< 15%	21.9%
Porcentaje de casos tratados de HSIL/CIN2+ con citología \geq HSIL/CIN2 a los 6 meses del tratamiento	< 10%	3.17%
Cumplimiento de administración de vacunación frente al VPH post conización	> 90%	62.2%