

# MARGEN QUIRÚRGICO LIBRE EN LAS PACIENTES CONIZADAS EN ANDALUCÍA ENTRE LOS AÑOS 2018 Y 2020. RESULTADOS PRELIMINARES ESTUDIO NERJA 1.



Rodríguez Jiménez I, Jurado Navarrete IM, Vargas Lazcano JA, Monserrat Jordan JA, Enriquez López Antonia, Fiol Ruiz Gabriel.

## ANTECEDENTES


El Proceso Asistencial Integrado Cáncer de Cérvix de la Junta de Andalucía establece como criterio de calidad un porcentaje de bordes libres en la conización del 70 %. La AEPCC recomienda un porcentaje de bordes libres  $\leq 20$  % con un margen libre endocervical  $\leq 15$  %.

## MÉTODO


El Grupo Andaluz para el Estudio y la Prevención de la Infección por el Virus del Papiloma Humano (Gaepi-VPH) está integrado por ginecólogos de las Unidades de Tracto Genital Inferior de los principales hospitales de Andalucía. Este trabajo refleja resultados de una primera fase descriptiva enmarcada en el estudio Nerja I, que pretende evaluar la importancia pronóstica del tipaje postcono en Andalucía. Se presentan los datos recogidos en la base de datos común de Gaepi-VPH y el objetivo del trabajo es la descripción del porcentaje de borde afecto en las 669 conizaciones realizadas en 13 hospitales de Andalucía desde enero de 2018 y diciembre de 2020.

## RESULTADOS

En la colposcopia previa, el porcentaje de colposcopias no adecuadas resultó del 5,4 % con un 54,4% de cambios G2, siendo la lesión más frecuentemente evidenciada el epitelio acetoblanco (70,4 %). La histología final de la pieza de conización se definió con la siguiente distribución: 85,9 % de CIN II-III; CIN I, 3,1 %; carcinoma escamoso, 1,5 %, adenocarcinoma 0,6 % y conizaciones en blanco 5,8 %.



El porcentaje de borde afecto en esta muestra resultó del 25 %, distribuyéndose en el 15 % cuando el afecto era el borde exocervical, el 7,3 % endocervical y el 2,7 % restante con ambos bordes afectados, exo y endocervical. Se encontró afectación del canal endocervical en el 24,1 % de las mujeres intervenidas.



## CONCLUSIONES

El estudio descriptivo de los márgenes afectados de las mujeres conizadas en Andalucía revela un porcentaje en la línea de lo recomendado pero con necesidad de mejora.